

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

**Grupo químico:** La cinetina pertenece al grupo químico de las Citoquininas.  
**X-CYTE®**, es un fitorregulador que contiene Citoquininas naturales. Se debe evitar su inhalación, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos.  
**Durante la preparación:** usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma.  
**Durante la aplicación:** Usar como protección ropa adecuada que impida el contacto del producto con la ropa o el cuerpo. Usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y bota de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto.  
**X-CYTE®** no es tóxico para aves, peces ni abejas.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DEL ENVASE, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUORIDADES COMPETENTES”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LOS LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”

**Instrucciones de triple lavado:**

**Paso 1:** Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

**Síntomas de Intoxicación:** No se han descrito síntomas posibles de intoxicación, dada la baja toxicidad del producto.

**Primeros auxilios:**

**En caso de contacto cutáneo:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si es necesaria la asistencia médica. **En caso de contacto ocular:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si es necesaria la asistencia médica. **En caso de Inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. Si es necesaria la asistencia médica. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. Si es necesaria la asistencia médica. **Antídoto:** No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Tratamiento sintomático.

“ EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

**Teléfono de emergencia:** STOLLER DE CHILE (72) 2314789 –CITUC (2) 26353800

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

Conserve X-CYTE®, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes y/o o semillas.

# X-CYTE®

## CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

### FITORREGULADOR

**X-CYTE®**, es un fitorregulador recomendado para estimular la división celular durante el crecimiento y desarrollo de frutos. Aplicar según el cuadro de Instrucciones de Uso.

**COMPOSICIÓN:**

Cinetina\*.....0,044% p/v (0,44 g/L=0,4 g/Kg)

Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1L)

\*6-furfurilamino-9H-purina

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 4187**

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**

Lote N°.....  
Contenido Neto: 1 Lt.  
Fecha de vencimiento .....

**STOLLER ENTERPRISES INC.**

4001 W. San Houston PrkWYn.,  
Suite # 100 Houston TX, 77043  
Estados Unidos

Importado y Distribuido por:

**STOLLER DE CHILE S.A.**

Ruta Longitudinal 5 Sur, Km 192.

Fono: 75-2314789

Curicó, Chile

stoller@stoller.cl

**INSTRUCCIONES DE USO:**

**X-CYTE®**, es un fitorregulador recomendado para estimular la división celular durante el crecimiento y desarrollo bayas en vides, cerezos y arándanos. **X-CYTE®**, se puede aplicar vía foliar o dirigido a la fruta, de acuerdo con el cuadro de Instrucciones de Uso.

**Instrucciones de Uso:**

| Cultivo     | Dosis (L/ha) | Observaciones                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uva de Mesa | 3            | Número de aplicación por temporada: 2.<br>Primera: con la 1º etapa de crecimiento.<br>Segunda: con la 2º etapa de crecimiento.<br>Para Crimson Seedless sólo se recomienda una aplicación de crecimiento<br>Mojamiento: 2000-2500 Lt/ha. |
| Cerezo      | 0,75         | Número de aplicaciones: 2. Primera:<br>50% de caída de pétalos.<br>Segunda: 7 días después.                                                                                                                                              |
| Arándano    | 0,75 a 1     | Número de aplicaciones: 2 a 4.<br>Primera: Caída de pétalos.<br>Segunda: Cada 10 días.<br>Siguietes: cada 10 días                                                                                                                        |

**Modo de aplicación:** Para la aplicación por inmersión se recomienda aplicar una dosis de 1 litro de **X-CYTE®** en 100 litros de agua (1%). Aplicando junto con la primera y segunda aplicación de Ácido Giberélico de crecimiento.

**Preparación de la mezcla:**

Mezclar la cantidad requerida para la aplicación en el estanque del equipo aplicador lleno hasta la mitad de su capacidad, con el agitador funcionando. Luego, completar con la cantidad de agua requerida.

**Compatibilidad:** Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. **Incompatibilidad:** Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de hacer la mezcla definitiva. **Fitotoxicidad:** No es fitotóxico si es usado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. **Tiempo de Reingreso (personas y animales):** media hora después de la aplicación. **Carencia:** No tiene.

El producto no debe ser aplicado cuando hay pronóstico de lluvias, dominio de vientos fuertes, presencia de heladas ni estrés hídrico en las plantas árboles en el caso del cerezo.

**Nota al comprador:**

El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta. Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación, están fuera del control del vendedor, los eventuales daños producidos por un mal uso o almacenamiento indebido, no son responsabilidad del vendedor.

© Marca registrada de Stoller de Chile.



## CUIDADO

